



ECOREGISTROS REVISTA - Artículo N° 8 - 2011

PRIMEROS REGISTROS DE CARPINTERITO COMÚN (*Picumnus cirratus*) EN LA RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR, BUENOS AIRES

Marcelo Gavensky e Ignacio A. Chantada

El Carpinterito Común (*Picumnus cirratus*) es la especie del género *Picumnus* de mayor distribución geográfica en Argentina, con tres subespecies descriptas. Con un largo aproximado de sólo 8 centímetros (Narosky & Izurieta, 2010), es uno de los piciformes más pequeños del país. Además de su tamaño reducido, posee los siguientes caracteres diagnósticos de identificación: boina negra punteada de blanco, amplia frente roja en machos, cola negra con tres listas blancas, y ventral barrado. Esta última característica y la ausencia de coloración canela en cuello la diferencian de las otras especies del mismo género en Argentina (Carpinterito Cuello Canela, *P. temminckii*, y Carpinterito Ocráceo, *P. nebulosus*).

El hábitat mencionado para la subespecie *P. cirratus pilcomayensis* (Hargitt, 1891) consiste en bosques y sabanas de tipo chaqueño, con una distribución que incluye el este de Salta, este de Catamarca, este de La Rioja, noreste de San Luis, norte de Córdoba, norte de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Formosa y noreste de Buenos Aires (Costa, 2011) donde existen registros habituales en Vuelta de Obligado (San Pedro).

Durante una salida de observación en la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) (34° 36' 22.04" S, 58° 21' 3.51" O) el 25 de septiembre de 2010 se identificó un ejemplar

de Carpinterito Común posado en un Ceibo (*Erythrina crista-galli*), a escasa distancia del observador (Gavensky M.). Permaneció allí por un breve lapso de tiempo y sin poder ser fotografiado.

El 14 de abril de 2011 la especie fue registrada por segunda vez en la reserva. Un individuo fue localizado por su llamado y luego avistado "tamboreando" en una Retama (*Retama sphaerocarpa*). Vocalizó nuevamente y se trasladó a un Sauce Criollo (*Salix humboldtiana*) y luego a una Chilca (*Baccharis salicifolia*) tras lo cual se alejó de la vista de los observadores (Gavensky M. y Chantada I.), dejando oír a la distancia nuevamente su vocalización. El ejemplar no pudo ser fotografiado. Dos días más tarde (el 16 de abril de 2011), los observadores se encontraban en el sitio de aquel último registro, cuando oyeron a la distancia el llamado característico de la especie, tras lo cual fue localizado un individuo hembra "tamboreando" en un Ceibo de bajo porte, oculto entre la vegetación. Luego pudo ser observado claramente a escasa distancia sobre otro Ceibo, donde continuó recorriendo y tamboreando unos instantes hasta que inició vuelo y se perdió de vista, atravesando el camino. Éste último registro fue fotografiado (Figuras N° 1 y N° 2).

Estos registros confirman la presencia de Carpinterito Común en la RECS, siendo esta localidad el punto más austral dentro de la



ECOREGISTROS REVISTA - Artículo Nº 8 - 2011

distribución geográfica conocida de la especie.

BIBLIOGRAFÍA

COSTA M., R. MOLLER JENSEN Y OTROS. 2011. Proyecto Freebirds Guía de las Aves. <<http://www.freebirds.com.ar/492.htm>> accedida el 08/04/2011.

NAROSKY, T & D. YZURIETA. 2010. Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: guía de identificación edición total – a field guide total. - 16a ed. - Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires.

PUGNALI, G. Y P. CHAMORRO (compiladores). 2006. Lista de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Aves Argentinas / AOP. Buenos Aires.



ECOREGISTROS REVISTA - Artículo Nº 8 - 2011

Figura N° 1. Carpinterito Común en la RECS. Fotografía: Marcelo Gavensky





ECOREGISTROS REVISTA - Artículo Nº 8 - 2011

Figura N° 2. Carpinterito Común en la RECS. Fotografía: Ignacio Chantada

