ecoregistros.com.ar
Registros Ecológicos de la Comunidad

ECOREGISTROS REVISTA N° 1 - Artículo Nº 18 - 2011

REGISTROS ACTUALES DE PLAYERO ALA BLANCA (*Tringa semipalmata*) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Esteban Argerich[1], Leonardo Mannarino[2] y Jorge La Grotteria[3]

[1] Correo electrónico: eca@ilbelbagno.com
[2] Correo electrónico: leonardomannarino@hotmail.com
[3] Correo electrónico: jorgelg21@hotmail.com

El Playero Ala Blanca (*Tringa semipalmata*) es un ave de comportamiento pasivo (Narosky & Yzurieta, 2010). Posee cuerpo grande con pico largo y robusto, presenta cabeza, cuello y partes superiores gris parduzco, una corta ceja blanca antes del ojo, mientras que las partes inferiores son blancuzcas con el pecho gris parduzco lavado, las alas tienen un contrastado diseño blanco y negro visible en vuelo, sus patas son gris azuladas, y en plumaje nupcial es estriado y barrado (Rodríguez Mata *et al.*, 2006). Se distinguen dos subespecies, la del Este o *T. s. semipalmata* y la del Oeste o *T. s. inornata,* las cuales poseen diferencias en el plumaje nupcial, *T. s. inornata* es más pálido, con menos estrías y barras en el cuello, pecho y flancos (Del Hoyo *et al.*, 1996).

Se alimenta de pequeños moluscos, insectos acuáticos, peces, y crustáceos, especialmente cangrejos (Del Hoyo *et al.*, 1996).

Se trata de una especie migrante que nidifica en el hemisferio norte e inverna más al sur en primavera y verano (Narosky & Yzurieta, 2010). Ambas subespecies difieren en sus hábitos migratorios (Vuilleumier, 2010), *T. s. semipalmata* nidifica en la costa este de América del Norte desde el sur de Canadá hasta México y el Caribe a lo largo de la costa del golfo e inverna en la costa atlántica de Sudamérica llegando al sur de Brasil (Hayman *et al.*, 1986; Del Hoyo *et al.*, 1996), mientras que *T. s. inornata* nidifica en el sur de Canadá y noroeste de EE.UU. migrando a las costas de América del Sur principalmente la costa del pacífico hasta el norte de Chile (Del Hoyo *et al.*, 1996; Vuilleumier, 2010).

En Argentina, la especie fue avistada en 1977 por Mauricio Rumboll en Río Grande, Tierra del Fuego (Olrog, 1979). Luego fue registrada en Punta Rasa, Buenos Aires por Roberto y Marta Straneck (Canevari *et al.*, 1991). Varios registros sucedieron nuevamente en este último lugar (Jaramillo, 2000; Roesler *et al.*, 2004). También se lo ha encontrado en la laguna de Mar Chiquita, Córdoba (Yzurieta, 1995). La especie podría estar sub-observada, dado su parecido con otras especies de playeros, pero aparenta llegar a nuestras costas en bajo número (Chebez, 2009). Existen registros novedosos en Uruguay (Gambarotta *et al.*, 1987) y en Chile (Vuilleumier, 1995).

Debido a que la especie se considera rara para Argentina, vemos útil informar observaciones actuales de la especie en distintos lugares y fechas con el fin de

contribuir en su conocimiento. A continuación enumeramos dos nuevos registros de Playero Ala Blanca en la provincia de Buenos Aires.

Albufera de Mar Chiquita:

El 23 de julio de 2011 un Playero Ala Blanca fue observado por Esteban Argerich y Leonardo Mannarino en uno de los canales que bordean la ciudad de Mar Chiquita (37° 44' 18,99" S; 57° 25' 48,22" O). El ejemplar poseía plumaje de reposo (Figura N° 1), se encontraba solo, alimentándose en el fondo barroso. Ese día se dio la particularidad de un muy fuerte y sostenido viento del oeste, motivo por el cual el agua de la marea no llegó a cubrir los bancos de la laguna ni aún durante la pleamar.

Ante el intento de los observadores de mejorar la aproximación el ave voló (Figura Nº 2; se pueden apreciar las bandas alares blancas) para posarse a unos 100 metros, donde se asoció a una pequeña bandada mixta de Becasa de Mar (*Limosa haemastica*) y Pitotoy Grande (*Tringa melanoleuca*) (Figura N° 3, se lo puede comparar posado junto a un Pitotoy Grande). Luego asociados volaron nuevamente (Figura N° 4, puede ser comparado en vuelo junto a un Pitotoy Grande).

Reserva Natural Municipal Punta Rasa:

El 24 de septiembre de 2011 un ejemplar de Playero Ala Blanca fue observado por Jorge La Grotteria en la Reserva Natural Punta Rasa (36° 17' 42.99" S; 56° 46' 38.63" O). El mismo poseía plumaje de reposo (Figura N° 5), se encontraba cerca de varios ejemplares de otras especies migrantes aunque en ningún momento se asoció con estos y siempre se mantuvo solitario.

Al estar cerca del ejemplar éste adoptó una posición de alerta y se puso a cabecear de manera similar a los demás *Tringa*, pero su cabeceo era más lento y exagerado, moviendo su cabeza desde bien atrás hasta bien adelante y dejándola agachada. Luego al volar se hicieron bien notables las bandas alares blancas que se describen en su nombre común, se posó unos cuantos metros adelante y comenzó a comer lo que serían restos de algún molusco bivalvo.

Ambos ejemplares registrados poseían plumaje de reposo lo que dificulta la identificación de la subespecie.

BIBLIOGRAFÍA

CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. R. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRÍGUEZ MATA Y R. J. STRANECK. 1991. Nueva Guía de las Aves Argentinas. I: 411 págs. Y II: 497 págs., Fundación Acindar. Buenos Aires.

CHEBEZ, J. C. 2009. Otros que se van. Fauna Argentina Amenazada. 552 págs. Albatros. Buenos Aires.

DEL HOYO, J., A. ELLIOT Y J. SARGATAL (EDS.). 1996. Handbook of the birds of the world,

Vol. 3, Hoatzin to Auks. 821 págs., Birdlife International y Lynx, Barcelona.

GAMBAROTTA, E. A., J. GRAVINO Y A. BARCA. 1987. Una nueva especie de ave para Uruguay: el Playero Aliblanca. Nuestras Aves, 14: 9-10. Buenos Aires.

HAYMAN, P., J. MARCHANT Y T. PRATER. 1986. Shorebirds. An indentification guide to the waders of the world. 412 págs., Croom Helm. Londres.

JARAMILLO, A. P. 2000. Punta Rasa, South America's first vagrant trap?. Cotinga, 14: 33-38.

NAROSKY, T. & D. YZURIETA. 2010. Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition. 16a ed. 427 págs., Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.

OLROG, C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana XXVII, 324 págs., Fundación Miguel Lillo. Tucumán.

RODRÍGUEZ MATA, J., F. ERIZE. Y M. RUMBOLL. 2006. Guía de campo Collins, Aves de Sudamérica, No Passeriformes. Letemendia Casa Editora. Harper Collins Publishers. Buenos Aires, Argentina.

ROESLER, I., G. D. PUGNALI Y M. DELLA SETA. 2004. Observación del Playero Ala Blanca (*Catoptrophorus semipalmatus*) en Punta Rasa, Partido de General Lavalle, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestras Aves, 48: 24-25. Buenos Aires.

VUILLEUMIER, F. (ED.). 2010. Birds of North America. The Complete Photographic Guide to Every Species. 744 págs., American Museum of Natural History DK Publishing.

VUILLEUMIER, F. 1995. Boreal migrant birds in southern South America: distribution, abundance and ecological impacto on neotropical breeding species. Ecotrópica, 1: 99-145.

YZURIETA, D. 1995. Manual de reconocimiento y evaluación ecológica de las aves de Córdoba. Ministerio de Agricultura y Ganadería y Recursos Renovables. 396 págs., Córdoba. Argentina.

Figura N° 1. Playero Ala Blanca en la albufera de Mar Chiquita el 23 de julio de 2011. Fotografía: Esteban Argerich.

Figura N° 2. Playero Ala Blanca preparándose para levantar vuelo, en la albufera de Mar Chiquita el 23 de julio de 2011. Fotografía: Leonardo Mannarino.

Figura N° 3. Playero Ala Blanca junto a un Pitotoy Grande, en la albufera de Mar Chiquita el 23 de julio de 2011. Fotografía: Leonardo Mannarino.

Figura N° 4. Playero Ala Blanca junto a un Pitotoy Grande, en la albufera de Mar Chiquita el 23 de julio de 2011. Fotografía: Esteban Argerich.

Figura N° 5. Playero Ala Blanca en la Reserva Natural Punta Rasa el 24 de septiembre de 2011. Fotografía: Jorge La Grotteria.