



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 3 - 2012

NUEVOS REGISTROS DEL BURLISTO PICO CANELA (*Myiarchus swainsoni*) EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO, ARGENTINA

Ignacio Hernandez¹

¹Correo electrónico: ignaciorh@gmail.com

El Burlisto Pico Canela (*Myiarchus swainsoni*) es un ave de la familia Tyrannidae. Presenta el dorso pardo-oliváceo, la garganta y el pecho gris claro, la zona ventral amarillenta, la cola y las alas pardas. Estas últimas presentan unos fuertes filetes blancuzcos en cubiertas y remeras. Posee un notable semicopete eréctil y el pico de una coloración acanelada en la mandíbula (Narosky e Yzurieta, 2010).

Se asemeja bastante a otras especies de *Myiarchus* como el Burlisto Cola Castaña (*M. tyrannulus*) y el Burlisto Pico Negro (*M. ferox*) diferenciables principalmente por el canto además de sutiles características que a veces suelen ser imperceptibles en observaciones de campo, como los márgenes de las timoneras.

El Burlisto Pico Canela es una especie migratoria. Se reconocen dos subespecies para Argentina: *M. s. swainsoni* que llega solo al noreste de Argentina (Corrientes y Misiones) (De La Peña, 1999), y *M. s. ferocior* que cría en época estival en el sudeste de Bolivia, oeste de Paraguay, y Argentina (hasta las provincias de La Pampa y Buenos Aires), y migra posteriormente a la cuenca del río Amazonas llegando hasta el sur de Colombia en el invierno (Del Hoyo *et al.*, 2004).

El extremo sur de su distribución es conocida por Olrog (1979) hasta La Pampa y Buenos Aires. Es marcada por Narosky e Yzurieta (1993) para el centro-sur de La Pampa como punto más austral y en Buenos Aires solo para el noreste. Nores (1986) cita por primera vez a la especie para la provincia de Río Negro por un ejemplar observado y escuchado en Viedma, sobre el río Negro en 1986; por lo que De La Peña (1999) señala a la especie desde el norte del país al oeste de los ríos Paraguay y Paraná, hasta Mendoza, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro. En Narosky e Yzurieta (2003) mencionan su límite de distribución austral para el este de Mendoza, San Luis y noreste de Buenos Aires, y señalada con un marcado más claro con significado de circunstancial para todo el centro de La Pampa y noreste de Río Negro. Luego en Pérez *et al.* (2006) se dan a conocer nuevas observaciones de la especie en el centro-norte de Río Negro, Chimpay en 1994, 1995 y 1999; y una para Rawson, Chubut en el 2000. Morici (2009) registra dos parejas de la especie en el sudoeste de Buenos Aires, partido de Puán en el 2006, zonas en donde aún quedan algunos parches de espinal y monte pero en las cuales hay muy pocos registros documentados. Y ya en Narosky e Yzurieta (2010) se muestra el límite de su distribución austral para el este de Mendoza, San Luis y noreste de Buenos Aires, y también señalado como circunstancial para el centro de La Pampa, centro-este de Río



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 3 - 2012

Negro y nordeste de Chubut. En el nordeste de Buenos Aires es bien conocida, incluso en nuevas reservas naturales como es el caso de la Reserva Natural de Pilar (Olejnik, 2011).

En su rango de distribución habita el bosque chaqueño, espinales y selvas (Narosky e Yzurieta, 2010), como así también sabanas y bosques de transición (Olrog, 1984).

A continuación se detallan algunos registros de la especie para la localidad de General Roca, Río Negro.

General Roca - Sector "Apycar"

El 5 de noviembre de 2011 detecté un ejemplar solitario que vocalizaba desde el

interior de un bosque de Sauce Criollo (*Salix humboldtiana*) cercano a un brazo del río Negro (39° 5' 24.19" S; 67° 34' 9.98" O). En un primer momento desconocí la vocalización, luego este voló a varios metros hasta una alameda cercana a mí, permitiéndome la confirmación visual y la toma de algunas fotografías (Figura Nº 1). Al día siguiente, 6 de noviembre fotografié otro ejemplar (Figura Nº 2 y 3) también en árboles añosos de Sauce Criollo. Estos bosques cubren las orillas de un canal artificial que alimenta un piletón cementado utilizado como balneario y que luego desemboca en un brazo del río Negro. El lugar de este segundo registro (39° 5' 6.53" S; 67° 34' 42.88" O) se encuentra distanciado por aproximadamente 1000 metros del sector mencionado para el primer registro.



Figura Nº 1. Burlisto Pico Canela (*Myiarchus swainsoni*) en General Roca - Sector "Apycar", provincia de Río Negro el 05/11/2012. Fotografía: Ignacio Hernández.



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 3 - 2012

Este segundo ejemplar se mostró mucho más confiado que el anterior. Por la escasa diferencia de tiempo entre los avistajes y la distancia entre un sector y el otro puedo asegurar que eran diferentes individuos.

General Roca – Sector “Paso Córdoba”

El 15 de noviembre, recorriendo el Área Natural Protegida Paso Córdoba, escuché vocalizar un ejemplar de Burlisto Pico Canela que además pudo ser confirmado visualmente. Este sector se encuentra ubicado sobre el margen sur del río Negro y

presenta una importante densidad de Sauce Criollo y Tamarisco (*Tamarix gallica*). La zona esta distante de los registros anteriores en Apycar por aproximadamente 10 Kilómetros. En días posteriores a este registro y en reiteradas oportunidades, fue posible escuchar nuevamente la vocalización en este sector.

El 8 de diciembre, a media mañana escuché vocalizar y luego observé un ejemplar en una arboleda de tamariscos ubicado cerca del sector conocido como “La Higuera” (39° 6' 56.70" S; 67° 36' 40.78" O).



Figura Nº 2. Burlisto Pico Canela (*Myiarchus swainsoni*) en General Roca - Sector “Apycar”, provincia de Río Negro el 06/11/2012. Fotografía: Ignacio Hernández.



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 3 - 2012



Figura Nº 3. Burlisto Pico Canela (*Myiarchus swainsoni*) en General Roca - Sector "Apycar", provincia de Río Negro el 06/11/2012. Fotografía: Ignacio Hernández.

General Roca – Zona urbanizada

El 9 de diciembre, a las 6 de la mañana identifiqué el canto de un ejemplar en una plaza ubicada dentro de la ciudad de General Roca (39° 0' 53.25" S; 67° 35'32.19" O). Dicha plaza posee una densa población de arboledas exóticas (sauces llorones, eucalyptus, fresnos, etc.). Esta vez se pudieron observar dos individuos que vocalizaban desde la parte media-alta de las frondosas arboledas.

Aquí se adicionan nuevos registros de Burlisto Pico Canela (subespecie *M. s. ferocior*) para la provincia de Río Negro, y se

deja en evidencia un desplazamiento más al oeste dentro de la misma.

BIBLIOGRAFÍA

DE LA PEÑA, M. R. 1999. *Aves Argentinas, Lista y Distribución*. 244 págs. LOLA. Buenos Aires.

DEL HOYO, J., A. ELLIOT Y J. SARGATAL (eds.). 2004. *Handbook of the birds of the world, Vol. 9, Cotingas to Pipits and Wagtails*. 863 págs., Birdlife International y Lynx, Barcelona.



ecoregistros.com.ar
Registros Ecológicos de la Comunidad



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 3 - 2012

MORICI, A. 2009. Primer registro de Burlisto Pico Canela (*Myiarchus swainsoni*) en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*. 54: 7-8.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 1993. *Guía para la identificación de las Aves de Argentina y Uruguay*. 4a ed. 346 págs., Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2003. *Guía para la identificación de aves de la Argentina y Uruguay*. Edición de oro. Vázquez Manzini Editores. Buenos Aires, Argentina.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. *Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition*. 16a ed. 427 págs., Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.

NORES, M. 1986. Nuevos registros para aves de Argentina. *Hornero*. 12: 304–307.

OLEJNIK, N. 2011. Cinco nuevas especies para la avifauna de la Reserva Natural Municipal de Pilar. *EcoRegistros Revista*. 1 (10).

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*. 27: 1-324.

OLROG, C. C. 1984. *Las Aves Argentinas*. Colección Guías de campo Nº 1.

PÉREZ, C. H. F., K. DELHEY Y P. F. PETRACCI. 2006. Aves nuevas o poco frecuentes del norte de la Patagonia argentina. *Nuestras Aves*. 52: 25-29. Buenos Aires.