



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 5 - 2012

## NUEVOS REGISTROS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ÁGUILA SOLITARIA (*Buteogallus solitarius*) EN EL PARQUE NACIONAL CALILEGUA, JUJUY, ARGENTINA

Jorge La Grotteria<sup>1</sup>, Marcelo Gavensky<sup>2</sup> y Hernán Alvarado<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Correo electrónico: jorgelg21@hotmail.com

<sup>2</sup> Correo electrónico: gavensmar@gmail.com

<sup>3</sup> Correo electrónico: hernalvarado@yahoo.com.ar

El Águila Solitaria (*Buteogallus solitarius*), antes atribuida al género *Harpyhaliaetus* y recientemente ubicada en *Buteogallus* (Remsen *et al.*, 2012), está considerada como Casi Amenazada a nivel internacional (Birdlife International, 2011) y En Peligro a nivel nacional (AA/AOP y SAyDS, 2008). Es una rapaz selvática crestada, de gran porte y con un peso cercano a los 3 kg. De coloración gris pizarra o negra, presenta una notable faja blanca en el centro de la cola y un reborde blanco en la punta. Las alas son largas y anchas, y las partes desnudas tanto la cera del pico como las patas son amarillentas (Chebez, 2008). Habita los bosques y selvas húmedas montanas desde el oeste de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta el extremo noroeste de Argentina, mayormente entre los 600 y 2200 m s.n.m. (Chebez, 2008; BirdLife International, 2011), aunque puede ser hallada en selvas entre los 300 y 2300 m s.n.m. (Brown y Amadon, 1968). A pesar de su extensa distribución es generalmente rara y muy localizada (BirdLife International, 2011). Dentro de la provincia de Jujuy fue registrada por primera vez en el Parque Nacional Calilegua el 30 de junio de 1989 (Schaab, 1990) volando bajo sobre el arroyo Aguas Negras a unos 3 km de su confluencia con el río San Lorenzo (600 m s.n.m.). Desde entonces existen ya varias observaciones actuales en el parque: una pareja y un individuo solitario en agosto de 1996 y una pareja en julio de 2004, todos ellos en selvas montanas entre los 850 y 900 m s.n.m.. Estos registros corresponden a la

misma zona y diferentes años, lo cual hace suponer la presencia estable del águila en el parque (Juhant y Roesler, 2005).

Para el resto del país se conoce en la provincia de Salta, donde se la cita por primera vez para Argentina en Orán en 1969 a unos 700 m s.n.m. (Höy, 1969), en la localidad de Rivadavia por Contino en 1974 (Olrog, 1979), además Olrog detectó entre el 1977 y 1980 una pareja en la localidad de Aguas Blancas (Olrog, 1985; De Lucca, 1991), señalada para P.N. Baritú en Chebez *et al.* (1998), en Tartagal fue detectada por Narosky en septiembre de 1983 a 1000 metros de altura sobrevolando la selva (De Lucca, 1991). En Chaco es señalada por Contreras *et al.* (1990). En Formosa, en Río Pilcomayo también por Contreras *et al.* (1990). En Corrientes, dentro del P.N. Mburucuyá (Lanfiutti, 2004). En Catamarca mencionan cinco registros en ambientes de Yungas entre los 900 y 2000 m s.n.m., y un registro también en la zona de vegetación de Yungas, pero en selva de transición a 640 m s.n.m. (Fra *et al.*, 2005). También es señalada para esta provincia por Moschione (2007). Y en Tucumán fue registrada en el embalse Escaba, ubicado en el Departamento Juan B. Alberdi a 700 m s.n.m. en mayo del 2006 (Marano y Echevarria, 2007).

En una visita al P.N. Calilegua el 17 de julio de 2011, nos encontrábamos a orillas del río San Lorenzo (23° 45' 45.10" S; 64° 51' 11.07" O) a 540 m s.n.m., donde registramos un ejemplar adulto de Águila Solitaria del cual pudimos observar su gran pico y garras, la



ECOREGISTROS REVISTA N° 2 - Artículo N° 5 - 2012

faja blanca de la cola y su predominante color negro (Figura N° 1), pudiendo esto último deberse a causa de un efecto visual producido por el día nublado y la observación a contraluz. El ejemplar cruzó el río y perchó a gran distancia (Figura N° 2) pudiéndose registrar el dorso con la cola abierta al momento en que perchaba. Se posó en las afueras del Parque Nacional, en propiedad privada.

Cinco días más tarde (22 de julio) Marcelo Gavensky avistó un ejemplar de Águila Solitaria, esta vez a unos 1150 m s.n.m., sobrevolando la selva montana a gran altura,

cerca de Mesada de las Colmenas (23° 42' 0.24" S; 64° 51' 59.46" O).

El águila planeó unos instantes dejando observar sus rasgos distintivos, para luego perderse tras la ladera de una sierra.

La primera observación reviste de importancia por ser uno de los primeros registros publicados con evidencia fotográfica de un ejemplar en libertad para el país. También, ambas observaciones ocurrieron a altitudes no mencionadas en la bibliografía para la especie dentro del P.N. Calilegua, además de constituir registros



**Figura N° 1.** Águila Solitaria sobrevolando el río San Lorenzo, P.N. Calilegua, Jujuy el 17/07/2011. Fotografía: Jorge La Grotteria.



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 5 - 2012



**Figura Nº 2.** Águila Solitaria perchando en las afueras del P.N. Calilegua el 17/07/2011. Fotografía: Jorge La Grotteria.

recientes de un ave naturalmente escasa a lo largo de toda su distribución geográfica. El avistaje realizado el 17 de julio permitió además registrar el uso por parte de la especie de áreas que, aunque limítrofes con el Parque Nacional, carecen del nivel de protección que posee éste último. A escasos metros del lugar donde el águila posó existe explotación agrícola del terreno con plantaciones de caña de azúcar.

#### BIBLIOGRAFÍA

AVES ARGENTINAS/AOP & SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 2008. Categorización de las aves de la Argentina

según su estado de conservación. Aves Argentinas /AOP y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires.

BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2011. Species factsheet: *Harpyhaliaetus solitarius*. Downloaded from <<http://www.birdlife.org>> on 22/08/2011.

BROWN, L. Y D. AMADON. 1968. *Eagles, hawks and falcons of the world*. Vol.2. London. Country Life Book.

CHEBEZ, J. C. 2008. *Los que se van: Aves. Fauna argentina amenazada*. Tomo 2: 416 págs., Editorial Albatros. Buenos Aires.



ecoregistros.com.ar  
Registros Ecológicos de la Comunidad



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 5 - 2012

CHEBEZ, J. C., REY, N. R., BABARSKAS Y A. G. DI GIACOMO. 1998. *Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina*. 126 pp. LOLA. Buenos Aires.

CONTRERAS, J., L. M. BERRY, A. O. CONTRERAS, C. C. BERTONATTI Y E. E. UTGES. 1990. Atlas ornitológico de la Provincia del Chaco. I. No Passeriformes. Cuadernos Técnicos Félix de Azara I. Corrientes, 164 páginas.

DE LUCCA, E. R. 1991. Rapaces amenazadas: El Águila Poma y el Águila Solitaria, estado de conocimiento actual. *Nuestras Aves*, 25: 14-15.

FRA, E. A., R. S. SALINAS, C. BARRIONUEVO, J. FIKDAMIR, Y P. R. RODRIGUEZ. 2005. Presencia y ocupación del Águila Solitaria (*Harpyhaliaetus solitarius*) en la provincia de Catamarca, Republica Argentina. *Nuestras Aves*, 50: 24-28.

Höy, G. 1969. *Harpyhaliaetus solitarius* (Tschudi) un águila nueva para Argentina. *Neotrópica*, 15 (48): 147-148.

JUHANT, M. Y I. ROESLER. 2005. *Nuevos aportes a la distribución del género Harpyhaliaetus en la Argentina*. XI Reunión Argentina de Ornitología, Buenos Aires.

LANFIUTTI, A. 2004. *Primer registro de (Harpyhaliaetus solitarius), en el Parque Nacional de Mburucuyá*. Sistema de información de biodiversidad, Administración de Parques Nacionales. <<http://www.sib.gov.ar/ficha/ANIMALIA>

>*harpyhaliaetus\*solitarius*> accedido el 03/10/2011.

MARANO, C. F., A. L. ECHEVARRIA. 2007. Primer registro del águila solitaria (*Harpyhaliaetus solitarius*) en la provincia de Tucumán, Argentina. *Acta zoológica Lilloana*, 51 (2): 164-165.

MOSCHIONE, F. 2007. Cuesta de las Higuierillas. En DI GIACOMO, A. S., M. V. DE FRANCESCO Y E. G. COCONIER (eds.). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 76-77. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la Avifauna Argentina. *Opera Lilloana*, 27. Tucumán.

OLROG, C. C. 1985. Status of Wet Forest Raptors in Northern Argentina. En: Conservation Studies on Raptors. ICBP Technical Publication N° 5.

REMSEN, J. V., JR., C. D. CADENA, A. JARAMILLO, M. NORES, J. F. PACHECO, J. PÉREZ-EMÁN, M. B. ROBBINS, F. G. STILES, D. F. STOTZ, AND K. J. ZIMMER. 2012. *A classification of the bird species of South America*. *American Ornithologists' Union*. <[http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SA\\_CCBaseline.html](http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SA_CCBaseline.html)> accedida el 02/02/2012.

SCHAAB, E. A. 1990. Águila solitaria en Jujuy. *Nuestras Aves*, 23: 32. Buenos Aires.