



NUEVOS REGISTROS DE PATO CRESTUDO (*Sarkidiornis melanotos*) PARA EL SUR DE ENTRE RÍOS Y PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Eduardo di Fiore¹, Carlos Fabián Danti², Miguel Ángel Roda³, José Aparicio⁴, Esteban Argerich⁵ y Julián García⁶

¹ Gral. Angel Pacheco N° 3634, Olivos (1636), Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: eddie@eddiemaxwell.com.ar

² Almafuerde N° 3572, Saladillo (B7260), Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: carlosdanti@fibertel.com.ar

³ Rivadavia N° 2945, Saladillo (B7260), Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: miguelroda@hotmail.es

⁴ Laprida N° 1718, Zarate (2800), Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: ji_aparicio@yahoo.com.ar

⁵ Gervasio Posadas N° 1325, Vicente López (1604), Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: eca@ilbelbagnio.com

⁶ Piran N° 147 Dto. 4, Wilde (1875), Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: julian@nightclubber.net

El Pato Crestudo (*Sarkidiornis melanotos*) tiene la cabeza y el cuello blancos salpicados de negro, dorsal negro con reflejos verdes, azules y morados, y ventral blanco con flancos negruzcos. Presenta dimorfismo sexual, el macho tiene una prominente carúncula negra sobre el pico que es más notable en período nupcial. La hembra tiene los flancos barrados de gris y no tiene carúncula (Rodríguez Mata *et al.*, 2006; Chebez, 2008; Narosky e Yzurieta, 2010), los dos presentan patas de color amarillento-verdoso (Casares, 1933; De la Peña, 1992). Se posan en los árboles y vuelan en fila (Narosky e Yzurieta, 2010). Habita sabanas inundadas, bosques abiertos a lo largo de ríos y lagos, pantanos, bosques inundados, pastizales, arroceras y bancos de arena (Chebez, 2008; BirdLife International, 2013).

La subespecie *Sarkidiornis melanotos sylvicola* está en riesgo de conservación a nivel nacional, Chebez (2008) la considera En Peligro, en tanto la SA y DS (2008) la categorizan como Amenazada. Su población se ve amenazada por la caza debido a su voluminoso porte (Chebez, 2008), también se ha documentado su captura (Miatello, 2009).

Es una especie natural de América, África y el sur de Asia. En América su distribución geográfica comprende Panamá y América del Sur. Al este de los Andes, desde Colombia y Venezuela hasta el norte de Argentina y Uruguay, y al oeste de los Andes en Ecuador y Perú (BirdLife International, 2013). En Argentina su distribución geográfica comprende las provincias de Misiones (Benstead *et al.*, 1998), Corrientes (Contreras, 1981), Formosa (Contreras, 1993; López-Lanús, 1997), Chaco (Chatellenaz, 2005), Santiago del Estero (Olrog, 1953; Torres y Michelutti,

2001), Jujuy (Casares, 1933), Salta (Babarskas *et al.*, 1995), Tucumán (De la Peña, 1999), Córdoba (Miatello, 2009; De la Peña, 2012), La Pampa (Grilli *et al.*, 2009), y Santa Fe (De la Peña, 2006). También se encuentra mapeada para la provincia de Entre Ríos para los departamentos Gualeguaychú e Islas del Ibicuy (De la Peña, 2006). Para la provincia de Buenos Aires, la especie cuenta con registros antiguos: Gibson (1920) se refiere a un ejemplar colectado cerca de Linconia el 15 de septiembre de 1898 y Casares (1933) hace mención a un ejemplar hallado en Ajó por Gibson que se encuentra depositado en el Museo Británico y agrega la observación de una pareja observada por Daguerre en la localidad de Las Flores en diciembre de 1913. Narosky y Di Giacomo (1993) la consideran una especie que no habita actualmente la provincia de Buenos Aires. En tanto Darrieu y Camperi (2001) no mencionan al Pato Crestudo para Buenos Aires ya que excluyen a las especies accidentales u ocasionales.

El 24 de marzo de 2013 en la localidad de Ceibas (33° 30' 14,25" S; 58° 45' 24,05" O), provincia de Entre Ríos, Argentina, en una zona pastoreada con inundaciones temporales próximo a parches de monte de Espinillo (*Acacia caven*), Eduardo Di Fiore, José Aparicio, Julián García y Esteban Argerich divisaron un grupo de seis patos crestudos en vuelo, todos adultos (Figura N° 1). Pasados varios minutos Eduardo Di Fiore pudo registrar el vuelo solitario de una hembra que se dirigía en el mismo sentido de la bandada anterior (Figura N° 2). Tanto la bandada como la hembra solitaria volaban con dirección sudeste en un día casi sin viento.

El 16 de mayo de 2013, en la zona rural del partido



Figura N° 1. Bandada de seis ejemplares de Pato Crestudo (*Sarkidiornis melanotos*) volando en fila en Ceibas, Entre Ríos, el 24 de marzo de 2013. Fotografía: Eduardo Di Fiore.



Figura N° 2. Vuelo de un ejemplar de Pato Crestudo (*Sarkidiornis melanotos*) hembra en Ceibas, Entre Ríos, el 24 de marzo de 2013. Fotografía: Eduardo Di Fiore.



ecoregistros.com.ar
Registros Ecológicos de la Comunidad



de Saladillo (35° 38' 10" S; 59° 46' 41" O), provincia de Buenos Aires, en un bañado temporario de un cuadro de rastrojo de soja, Carlos Fabián Danti y Miguel Ángel Roda observaron seis ejemplares de Pato Crestudo (Figuras N° 3 y 4). Se encontraban posados en la orilla junto a otros patos como Pato Picazo (*Netta peposaca*) y Pato Cuchara (*Anas platalea*). Al día siguiente observaron tres ejemplares en el mismo bañado, también junto a otros patos como Pato Overo (*Anas sibilatrix*), Pato Picazo y Pato Cuchara; y en otro bañado, a aproximadamente 500 metros, un ejemplar también junto a Pato Picazo y Sirirí Pampa (*Dendrocygna viduata*). En todas las ocasiones demostraron ser muy ariscos.

En la actualidad es una especie rara y escasa en toda su distribución (Chebez, 2008), la cual solo presenta citas antiguas en la provincia de Buenos Aires. Se presentan nuevos registros de Pato Crestudo para el sur de la provincia de Entre Ríos y evidencias modernas de la presencia en la provincia de Buenos Aires.

AGRADECIMIENTOS

A José Luis Fernández Guaraz y Marian Wigdorovitz por la compañía en el momento de la observación en Ceibas.



Figura N° 3. Pato Crestudo (*Sarkidiornis melanotos*) en un bañado temporario de un cuadro de rastrojo de soja, Saladillo, Buenos Aires el 16 de mayo de 2013. Fotografía: Carlos Fabián Danti.



Figura N° 4. Pato Crestudo (*Sarkidiornis melanotos*) en Saladillo, Buenos Aires el 16 de mayo de 2013. Fotografía: Miguel Ángel Roda.

BIBLIOGRAFÍA

AVES ARGENTINAS/AOP & SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 2008. *Categorización de las aves de la Argentina según su estado de conservación*. Aves Argentinas /AOP y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires.

BABARSKAS, M., J. VEIGA Y F. FILIBERTO. 1995. *Lista sistemática de las aves del Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina*. Monografía 6. L.O.L.A. Buenos Aires.

BENSTEAD, P. J., C. J. S. JEFFS, R. D. HEARN. 1998. Densidad de aves ribereñas en cuatro tributarios del Río Paraná en el NE de Argentina. *Hornero*, 15 (1): 68-71.

BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2013. Species factsheet: *Sarkidiornis melanotos*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 27/03/2013.

CASARES, J. 1933. Palmípedos argentinos. *Hornero*, 5(2): 145-159.

CHATELLENAZ, M. L. 2005. Aves del Valle del Río Paraná en la provincia del Chaco, Argentina: Riqueza, Historia Natural y Conservación. En Aceñolaza, F. G. (ed). *Temas de la Biodiversidad del Litoral Fluvial Argentino II*. Instituto Superior de Correlación Geológica, Tucumán, Argentina. *INSUGEO, Miscelánea*, 14: 527-550.

CHEBEZ, J. C. 2008. *Los que se van. Fauna argentina amenazada*. Tomo 2: 416 págs., Albatros, Buenos Aires.



CONTRERAS, J. R. 1981. Lista preliminar de la avifauna correntina. I. No Passeriformes. *Historia Natural*, 2: 21-28.

CONTRERAS, J. R. 1993. Acerca de algunas especies de aves del extremo sudeste de la provincia de Formosa, República Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 47: 1-8.

DARRIEU, C. A. Y A. R. CAMPERI. 2001. Nueva lista de las aves de la provincia de Buenos Aires. *Cobiobo* N°3-*Probiota* N°2. Sección de Política Ambiental. UNLP. Buenos Aires.

DE LA PEÑA, M. R. 1992. *Guía de aves Argentinas*. Editorial L.O.L.A. 139 pp.

DE LA PEÑA, M. R. 1999. *Aves Argentinas lista y distribución*. Editorial L.O.L.A. 244 pp.

DE LA PEÑA, M. R. 2006. *Nueva lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos*. Editorial L.O.L.A. 138 pp.

DE LA PEÑA, M. R. 2012. *Distribución y citas de aves de Entre Ríos*. Ediciones Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 6. Santa Fe, Argentina. 206 pp.

GIBSON, E. 1920. Further ornithological notes from the neighbourhood of Cape San Antonio, province of Buenos Ayres. Part III. Phoenicopteridae-Rheidae. *Ibis*, 12: 1-97.

GRILLI, P. G., F. M. IDOETA Y M. L. ARELLANO. 2009. Reparición del Pato Crestón *Sarkidiornis melanotos* en la Región Pampeana de Argentina. *Cotinga*, 31: 155-156.

LÓPEZ-LANÚS, B. 1997. *Inventario de las aves del Parque Nacional "Río Pilcomayo" Formosa, Argentina*. Monografía Especial L.O.L.A. N°4. Buenos Aires.

MIATELLO, R. A. 2009. Aves cuya presencia es poco común en la provincia de Córdoba, Argentina. Pato Crestudo (*Sarkidiornis melanotos*), Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*), Águila Solitaria (*Harpyhaliaetus solitarius*), Fiofío Plumizo (*Elaenia strepera*) y Jilguero Oliváceo (*Sicalis olivascens*). *Biológica*, 10: 72-74.

NAROSKY, T. Y A. G. DI GIACOMO. 1993. *Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus*. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA. Buenos Aires.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. *Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition*. 16a ed. 427 págs., Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.

OLROG, C. C. 1953. Sobre aves del noroeste argentino. *Hornero*, 10 (1): 84-85.

RODRÍGUEZ MATA, J., F. ERIZE Y M. RUMBOLL. 2006. *Aves de Sudamérica. Guía de Campo Collins*. 1ª Edición. Letemendia Casa Editora. Harper Collins Publishers. 384 págs. Buenos Aires.

TORRES, R. Y P. MICHELUTTI. 2001. Nuevos registros de aves escasas en la región central de la Argentina. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 1: 1-5.

Recibido: 14 de abril de 2013

Aceptado: 28 de junio de 2013