



## PRIMER REGISTRO DE BURRITO PICO ROJO (*Neocrex erythrops*) PARA LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Pablo Cantador<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Doctor Ghio 255, San Lorenzo (CP 2200), Santa Fe. Correo electrónico: pablo.cantador@gmail.com

El Burrito Pico Rojo (*Neocrex erythrops*) es un pequeño rálido, que posee el dorso pardo oliváceo sin manchas, subcaudal y flancos levemente barrados de negro y blanco, pico amarillo con su base roja y patas rojizas (Narosky e Yzurieta, 2010). Habita pastizales húmedos con árboles o campos abiertos, juncales densos y arrozales (Rodríguez Mata *et al.*, 2006).

Su presencia se encuentra documentada para Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil (BirdLife International, 2013) y se la menciona como migrante. En Argentina, la especie es conocida para las provincias de Jujuy (Olrog, 1958), Salta (Camperi, 1992), Formosa (López Lanús, 1997; Chebez *et al.*, 1998), Tucumán (Lillo, 1902; Wetmore, 1926), Chaco (Salvador y Narosky, 1987), Córdoba (Salvador S. en De la Peña (2013)) y Santa Fe (De la Peña, 2002). En Buenos Aires fue citada por Hudson (1876), pero resultó ser un registro erróneo (Narosky y Di Giacomo, 1993), luego fue citada por Roesler y Agostini (2012). Existe un registro extralimitar para Chubut en Península Valdés (Camperi, 1992).

El 20 de noviembre de 2013 a las 12:24 p.m. en zona de islas del Río Paraná, departamento de Victoria, provincia de Entre Ríos (32° 43' 46,66" S; 60° 40' 19,34" O) recorriendo un denso monte en su mayoría compuesto por Ceibo (*Erythrina crista-galli*), Timbó (*Enterolobium contortisiliquum*) y vegetación baja palustre típicas de estos humedales, observé un pequeño rálido a unos 10 mts de distancia sobre la rama de un Ceibo que se encontraba a 1,5 mts del suelo. El mismo se mostraba curioso y alerta (Figuras N° 1 y 2). Luego emprendió un vuelo bajo y se perdió de vista en el denso follaje del lugar.

Este pequeño monte se encuentra entre una laguna del lado este y un pequeño cauce de arroyo del lado oeste. Por el nivel del río en ese momento, la laguna

se encontraba con muy poca agua y el arroyo casi seco con algunos pequeños espejos de agua cubiertos en su mayoría de plantas acuáticas. Esta zona cambia constantemente acorde al nivel del Río Paraná, que en época de crecientes se inunda la mayoría del lugar. En el momento del registro el nivel del río se encontraba en 3,5 mts (medición San Lorenzo). Este es el primer registro de Burrito Pico Rojo para la provincia de Entre Ríos.

### AGRADECIMIENTOS

De regreso con las imágenes se consultó a referentes locales del COA Federal de la ciudad de Rosario y a Cesar Giarduz, miembro de Aves Argentinas, confirmando la identidad de este raro Burrito Pico Rojo. Quiero agradecer especialmente a Jorge La Grotteria y el equipo de la revista por su ayuda en armar la nota y conseguir información y bibliografía referente a esta ave poco conocida y registrada en nuestro país.

### BIBLIOGRAFÍA

BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2013. Species factsheet: *Neocrex erythrops*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 27/11/2013.

CAMPERI, A. R. 1992. Hallazgo extralimitar del Burrito Pico Rojo *Neocrex erythrops olivascens*. *Nuestras Aves*, 27: 30-31.

CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BARBASKAS Y A. G. DI GIACOMO. 1998. *Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina*. Administración de Parques Nacionales y Asociación Ornitológica del Plata. Monografía Especial L.O.L.A. N°12, 127 págs. Buenos Aires.

DE LA PEÑA, M. R. 2002. Burrito pico rojo (*Neocrex erythrops*) y burrito enano (*Coturnicops notatus*) en



**Figuras N° 1 y 2.** Burrito Pico Rojo (*Neocrex erythrops*) en zona de islas del Río Paraná departamento de Victoria, provincia de Entre Ríos, el 20 de noviembre de 2013. Fotografías: Pablo Cantador.



ecoregistros.com.ar  
Registros Ecológicos de la Comunidad



Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves*, 44: 21.

DE LA PEÑA, M. R. 2013. *Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: Edición ampliada*. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7, Ediciones Biológica, 786 pp.

HUDSON, W. H. 1876. Notes on the Rails of the Argentine Republic. *Proc. Zool. Soc. London*, 1876: 102-109.

LILLO, M. 1902. *Enumeración sistemática de las aves de la provincia de Tucumán*. Anales del Museo Nacional de Buenos Aires, 8: 169-221.

LÓPEZ LANÚS, B. 1997. *Inventario de las aves del Parque Nacional "Río Pilcomayo" Formosa, Argentina*. Monografía Especial. L.O.L.A. N° 4.

NAROSKY, T. Y A. G. DI GIACOMO. 1993. *Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus*. Vázquez Mazzini Editores, L.O.L.A. (Literature of Latin America), Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. *Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total*

*Edition*. 16a ed. 427 págs., Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.

OLROG, C. C. 1958. Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). IV. *Acta Zoológica Lilliana*, 16: 83-90.

RODRÍGUEZ MATA, J., F. ERIZE Y M. RUMBOLL. 2006. *Aves de Sudamérica. Guía de Campo Collins*. 1ª Edición. Letemendia Casa Editora. Harper Collins Publishers. 384 págs. Buenos Aires.

ROESLER, I. Y M. G. AGOSTINI (EDS). 2012. *Inventario de los Vertebrados de la Reserva Natural Punta Lara, provincia de Buenos Aires, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas No 8. Buenos Aires, Argentina.

SALVADOR, S. Y T. NAROSKY. 1987. Nuevos registros para aves argentinas. *Nuestras Aves*, 13: 9-11.

WETMORE, A. 1926. Observations on the birds of Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. *United States Nat. Mus. Bull*, 133: 1-4.

Recibido: 5 de diciembre de 2013

Aceptado: 10 de marzo de 2014