



NUEVAS OBSERVACIONES DE PATO CRESTUDO (*Sarkidiornis melanotos*) EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA, ARGENTINA

Romina del Blanco¹

¹Zona Rural, Eduardo Castex (6380), La Pampa, Argentina. Correo electrónico: rominadelblanco@yahoo.com

El Pato Crestudo (*Sarkidiornis melanotos*) es una especie inconfundible. Tiene la cabeza y el cuello de color blanco salpicado de negro, su dorsal es negro con reflejos verdes, azules y morados, y su ventral blanco con flancos negruzcos. Presenta dimorfismo sexual, el macho adulto tiene una prominente carúncula negra sobre el pico que es más notable en período nupcial. La hembra tiene los flancos barrados de gris y no tiene carúncula (Rodríguez Mata *et al.*, 2006; Chebez, 2008; Narosky e Yzurieta, 2010). Habita sabanas inundadas, bosques abiertos a lo largo de ríos y lagos, pantanos, bosques inundados, pastizales, arroceras y bancos de arena (Rodríguez Mata *et al.*, 2006; Chebez, 2008; BirdLife International, 2014).

La distribución en Argentina comprende las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero y Buenos Aires (De la Peña, 2013). Recientemente se observó en Catamarca (Lucero, 2014) y ha tenido apariciones novedosas en el sur de Entre Ríos y Buenos Aires (Di Fiore *et al.*, 2013) donde ya no se la consideraba como habitante (Narosky y Di Giacomo, 1993). Existen escasos registros para la provincia de La Pampa (Kin en Siegenthaler, 2004; Grilli *et al.*, 2009).

Chebez (2008) la considera En Peligro, en tanto la AA/AOP y SA y DS (2008) la categorizan como una especie Amenazada, mientras que Bruno *et al.* (2012) la consideran Rara para la provincia de La Pampa.

El 31 de agosto de 2014, cerca de la localidad de Eduardo Castex, departamento Conheló, provincia de La Pampa, Argentina, sobre una calle vecinal en una laguna temporal de tamaño medio (35° 54' 47,59" S; 64° 15' 28,34" O), observé una bandada de 10 a 12 ejemplares (Figura N° 1). Días después no fueron observados en la zona.

El 13 de septiembre de 2014, en otra salida de observación, junto a Ricardo Baglieri y Roberto

Miranda volvimos a divisar ejemplares de esta especie (Figura N° 2), en otra laguna de tamaño mayor ubicada entre un cuadro de rastrojo de maíz y un sembrado de avena, también en cercanías de Eduardo Castex (35° 56' 41,54" S; 64° 19' 28,41" O). El grupo de ejemplares observados en esa oportunidad se componía de casi la misma cantidad de individuos.

Se presentan nuevas evidencias de Pato Crestudo para la provincia de La Pampa, Argentina.

BIBLIOGRAFÍA

AVES ARGENTINAS/AOP & SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 2008. *Categorización de las aves de la Argentina según su estado de conservación*. Aves Argentinas /AOP y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires.

BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2014. Species factsheet: *Sarkidiornis melanotos*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 01/10/2014.

BRUNO, F., P. TALLADE, A. L. CASTRO SELTZER, A. P. ALAMO IRIARTE, J. J. MACEDA, C. POLANCO Y C. PASTOR. 2012. *Categorización de la Fauna Silvestre de Vertebrados de la provincia de La Pampa*. Informe Interno. Santa Rosa, La Pampa, Argentina.

CHEBEZ, J. C. 2008. *Los que se van. Fauna argentina amenazada*. Tomo 2: 416 págs., Albatros, Buenos Aires.

DE LA PEÑA, M. R. 2013. *Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: Edición ampliada*. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7, Ediciones Biológica, 786 pp.

DI FIORE, E., C. F. DANTI, M. A. RODA, J. APARICIO, E. ARGERICH Y J. GARCIA. 2013. Nuevos registros de Pato Crestudo (*Sarkidiornis melanotos*) para el sur de



Entre Ríos y para la provincia de Buenos Aires, Argentina. *EcoRegistros Revista*, 3(6): 24-28.

GRILLI, P. G., F. M. IDOETA Y M. L. ARELLANO. 2009. Reparición del Pato Crestón *Sarkidiornis melanotos* en la Región Pampeana de Argentina. *Cotinga*, 31: 155-156.

LUCERO, F. 2014. Primer registro de Pato Crestudo (*Sarkidiornis melanotos*) para la provincia de Catamarca, observaciones de Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) para la provincia de Salta y nuevas localidades de Doradito Oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis*) y Doradito Limón (*Pseudocolopteryx citreola*) para la provincia de San Juan, Argentina. *EcoRegistros Revista*, 4 (6): 14-18.

NAROSKY, T. Y A. G. DI GIACOMO. 1993. *Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus*. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA. Buenos Aires.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. *Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition*. 16a ed. 427 págs., Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.

RODRÍGUEZ MATA, J., F. ERIZE Y M. RUMBOLL. 2006. *Aves de Sudamérica. Guía de Campo Collins*. 1ª Edición. Letemendia Casa Editora. Harper Collins Publishers. 384 págs. Buenos Aires.

SIEGENTHALER, G. B. (Coord.). 2004. "Relevamiento de los Vertebrados de la Provincia de La Pampa". En: *Inventario integrado de los Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa. Clima, geomorfología, suelo, vegetación y fauna de vertebrados*. Reedición, CD multimedia. La Pampa, Argentina.

Recibido: 5 de octubre de 2014

Aceptado: 3 de enero de 2015



Figura N° 1. Pato Crestudo (*Sarkidiornis melanotos*) cerca de la localidad de Eduardo Castex, departamento Conhelo, provincia de La Pampa, el 31 de agosto de 2014. Fotografías: Romina del Blanco.



Figura N° 2. Patos crestudos (*Sarkidiornis melanotos*) cerca de la localidad de Eduardo Castex, departamento Conhelo, provincia de La Pampa, el 13 de septiembre de 2014. Fotografías: Romina del Blanco.