



PRESENCIA DEL BURRITO PICO ROJO (*Mustelirallus erythroptus*) EN SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA

Oscar Bernardo Quiroga¹

¹ Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán (4000), Tucumán, Argentina. Correo electrónico: oscarqui595@hotmail.com

El Burrito Pico Rojo (*Mustelirallus erythroptus*) es un pequeño rávido que se caracteriza por su dorso pardo oliváceo sin manchas, flancos y subcaudal levemente barrados de negro y blanco, pico amarillo con su base roja y patas rojizas (Narosky e Yzurieta, 2010). Habita pastizales húmedos con árboles o campos abiertos, pantanos, juncales densos y arrozales (Rodríguez Mata *et al.*, 2006).

La raza geográfica *M. e. olivascens* fue citada para las provincias argentinas de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán (de la Peña, 2016).

El 23 de diciembre de 2016 a las 11:25 hs un individuo adulto fue capturado al entrar a un local comercial de la ciudad Capital de Santiago del Estero (Figura Nº 1); hecho ocurrido luego de un día con condiciones climáticas adversas (fuertes vientos y lluvia).

El individuo fue mantenido cautivo durante 29 días en una jaula para paseriformes donde se le colocó dos recipientes, uno con agua para baño y bebida, y otro para alimentos (balanceado para pollito y para cachorro canino, carne vacuna y de pollo, frutas, verduras y hortalizas picadas finamente, Lombriz *Lumbricus terrestris*, Grillo *Acheta domesticus* y larvas de *Hermetia illucens*).

Se le tomaron datos morfométricos, siendo la longitud total: 18,50 cm, longitud del ala: 10,50 cm, longitud de la cola: 3,50 cm, longitud del tarso: 2,93 cm, longitud del culmen: 2,20 cm, altura del pico: 1,00 cm, ancho del pico: 0,91 cm, y su peso fue de 65 g. El individuo fue marcado con un anillo metálico (XA 25036), con la leyenda "devuelva a Instituto Miguel Lillo", perteneciente al Centro Nacional de Anillado de Aves de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la provincia de Tucumán.

En cautiverio se mostraba generalmente oculto en una mitad de la jaula (mitad tapada), algo asustadizo pero sin

lastimarse al volar en su habitáculo. Al manipularlo emitía una corta voz grave y áspera. Respecto a la alimentación mostraba preferencia por el alimento vivo y por último aceptaba el balanceado previamente humedecido.

El 21 de enero de 2017 a las 12:30 hs fue liberado en alrededores de la Reserva Isla Tara Inti (Figura Nº 2), volando inmediatamente a ocultarse en un Sunchal (*Baccharis* sp.). El sitio de liberación fue elegido por presentar un ambiente adecuado para la especie, donde se aprecian tupidas totoras (*Typha* sp.) y lagunas de aguas bajas a metros del Embalse de Río Hondo (Dpto. Río Hondo). En este sitio también es frecuente la presencia del Burrito Común (*Laterallus melanophaius*), pequeño rávido citado recientemente para la provincia (Quiroga *et al.*, 2015).

El plumaje nuevo y en buen estado del individuo y su actitud nerviosa indicarían que se trata de un animal silvestre; además cabe destacar que este tipo de aves (a excepción de Gallineta Overa *Pardirallus maculatus*) no se observan en pajarerías, forrajeras o ventas de mascotas en la provincia (O. Quiroga, obs. pers.).

Esta información corresponde al primer registro del Burrito Pico Rojo para la provincia de Santiago del Estero, ya que no fue incluido anteriormente en su avifauna (Nores *et al.*, 1991; de la Peña, 2016), y podría estar marcando una ruta migratoria hacia las provincias limítrofes donde fue registrado anteriormente (Chaco, Córdoba, Salta, Santa Fe y Tucumán) (de la Peña, 2016).

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Cristian O. Quiroga por colaborar con la captura y liberación de este pequeño rávido. A José Layús por apoyar la liberación del ejemplar y contribuir con la conservación de las aves que habitan en la Reserva Isla Tara Inti.



BIBLIOGRAFÍA

DE LA PEÑA, M. R. 2016. Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Ciconiidae a Heliornithidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino*, 19 (2): 1-437.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. *Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition*. 16a ed. 427 págs., Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires.

NORES, M., D. YZURIETA Y S. SALVADOR. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, 59: 157-196.

QUIROGA, O. B., O. R. CORIA, N. GÓMEZ, G. CHIMINO, F. JORGE, L. M. ROJAS, J. E. LLUGDAR Y M. ALCALDE. 2015. El Gaviotín negro (*Chlidonias niger*) y el Burrito común (*Laterallus melanophaius*) en Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves*, 60: 59-60.

RODRÍGUEZ MATA, J., F. ERIZE Y M. RUMBOLL. 2006. *Aves de Sudamérica. Guía de Campo Collins*. 1ª Edición. Letemendia Casa Editora. Harper Collins Publishers. 384 págs. Buenos Aires.

Recibido: 19 de febrero de 2017

Aceptado: 20 de abril de 2017



Figura N° 1. Burrito Pico Rojo (*Mustelirallus erythroptus*) en interior de local comercial de ciudad Capital de Santiago del Estero, 23 de diciembre de 2016. Fotografía: Cristian O. Quiroga.



Figura N° 2. Liberación de Burrito Pico Rojo (*Mustelirallus erythrops*) en alrededores de la Reserva Isla Tara Inti, el 21 de enero de 2017. Fotografía: Oscar B. Quiroga.